



# LINDENHOFGRUPPE

<i>Titel: Interner Transport von IPS-Patienten</i>	<i>Doc. No. 1</i> <i>Datum: 22/07/2016</i>
	<i>Revision No.</i>
<i>Keywords: Transport</i>	<i>Seite 1 von 2</i>
<i>Author: Hans-Martin Vonwiller</i>	
<i>Intensivstation, Lindenhofspital, Bern</i>	

## 1.0 Ziele der Richtlinie

- Therapeutische und diagnostische Interventionen trotz instabiler Situation ermöglichen
- Patientensicherheit gewährleisten

## 2.0 Vorbereitungen

### 2.1 Patient

- Kreislauf optimieren (Volumen?, Katecholamine?)
- Lunge optimieren (Intubation? NIV?)
  - Verträgt der Patient spätere Flachlagerung?
  - Bei beatmeten Patienten Transport-Respirator installieren
  - Achtung: Stellar hat Akku, High-Flow funktioniert nicht mit Transport-O2
- Diagnostische oder prophylaktische Mittel verabreichen (Kontrastmittel?, Flumucil?)
- Darf Patient iv.-Kontrastmittel erhalten, falls ja über welches Lumen?
- Alle Katheter und Drainagen auf Funktionsfähigkeit prüfen und gut fixieren
- Ernährung pausieren, Magensonde absaugen
- Unnötige Perfusoren (Heparin?) nach Rücksprache pausieren
- Kabel und Leitungen sind geordnet und führen von derselben Seite zum Patienten, ev. Verlängerung einbauen
- In den Perfusorspritzen hat es ausreichende Menge Medikament

### 2.2 Monitoring

- Ggf. arteriellen Katheter einlegen
- X2-Transportmonitor

### 2.3 Material

- Für beatmete Pat.:
  - Transportgestell mit O2 (Reserve getestet!)
  - Oxylog
  - Absaugeinrichtung (getestet!)
  - Ambu-Beutel mit Maske No 5
  - Medi-Box
  - Material nach Inventarliste
  - Liftschlüssel



# LINDENHOFGRUPPE

<i>Titel: Interner Transport von IPS-Patienten</i>	<i>Doc. No. 1</i> <i>Datum: 22/07/2016</i>
	<i>Revision No.</i>
<i>Keywords: Transport</i>	<i>Seite 2 von 2</i>
<i>Author: Hans-Martin Vonwiller</i>	
<i>Intensivstation, Lindenhofspital, Bern</i>	

- *Für nicht beatmete Pat.:*
  - Alternativ O2-Trolley mit O2 (Reserve getestet!)
  - Medi-Box
  - Material nach Inventarliste
- Ev. zusätzliche Medikamente (Sedation?, Analgesie?, Noradrenalin?, Ringer?)
- Stromkabel für Geräte
- Bei kardiopulmonalen Zwischenfällen Rea-Wagen anfordern

### 3.0 *Begleitung*

- Stabile Patienten: IPS-Pflegende
- Instabile Patienten: IPS-Pflegende und IPS-Arzt, falls nicht abkömmlich Anästhesie (Sucher 9796)